

*Geranium pusillum*, śláz zaniedbany *Malva neglecta*, śláz dziki *Malva silvestris*, rzepik pospolity *Agrimonia eupatoria*, kuklik pospolity *Geum urbanum*, pięciornik gęsi *Potentilla anserina*, pięciornik rozłogowy *Potentilla reptans*, jeżyna popielica *Rubus caesius*, fiołek trójbarwny *Viola tricolor*, fiołek polny *Viola arvensis*, tasznik pospolity *Capsella bursa-pastoris*, jaskier bulwkowy *Ranunculus bulbosus* i wiele innych, zwłaszcza traw, jak np. wiechlina roczna *Poa annua*, perz właściwy *Agropyron regens* i życica roczna *Lolium temulentum*.

Wyżej wymienione rośliny zajmują przydroża, okrajki oraz rejony w pobliżu zabudowań, gdzie także występują płaty synantropijnych zbiorowisk roślinnych *Epilobio-Salicetum capreae* z dzikim bzem czarnym *Sambucus nigra* i wierzbą iwą *Salix caprea* oraz wprowadzoną kaliną hordowiną, *Rubo-Salicetum capreae*, zbiorowisko jeżyn i wierzby iwy oraz zbiorowisko wysokich bylin *Tanacetum-Artemisietum vulgaris* z wrotyczem i bylicą pospolitą.

W rejonie inwentaryzowanego obszaru zachowały się nieduże fragmenty łąk i pastwisk, które są koszone raz do roku lub wypasane są przez konie.

Można wyróżnić tu zespół kośnej i wilgotnej łąki eutroficznej *Cirsium polygonetum* z rdestem węzownikiem *Polygonum bistorta* i ostrożniem warzywnym *Cirsium oleraceum*. Zanotowano tu następujące gatunki roślin naczyniowych: kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*, wyczyniec łąkowy *Alopecurus pratensis*, kostrzewa łąkowa i czerwona *Festuca pratensis*, *F. rubra*, kłosówka wełnista *Holcus lanatus*, tymotka łąkowa *Phleum pratense*, wiechlina łąkowa *Poa pratensis*, barszcz zwyczajny *Heracleum sphondylium*, jaskier ostry *Ranunculus acris*, jaskier rozłogowy *Ranunculus repens*, szczaw zwyczajny *Rumex acetosa*, konieczyna łąkowa i biała *Trifolium pratense*, *T. alba*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, wyka ptasia *Vicia cracca*, krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, świetlik łąkowy *Euphrasia rostkoviana*, mniszek lekarski *Taraxacum officinale*, gwiazdnica pospolita *Stellaria media*, przytulia właściwa *Galium verum*, powój *Convolvulus arvensis*, oset nastroszony *Carduus acanthoides*, ostrożeń warzywny *Cirsium oleraceum*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, rzeżucha łąkowa *Cardamine pratensis*, firletka poszarpana *Lychnis flos-cuculi*, dzwonek rozpierzchły *Campanula patula*, knieć błotna *Caltha palustris*, kuklik zwisły *Geum riale*, niezapominajka błotna *Myosotis scorpioides*.

Z ciekawszych gatunków zanotowano bodziszka łąkowego *Geranium pratense*.

Zanotowano tu zespół situ rozpierzchłego *Epilobio-Juncetum effusi* z takimi roślinami jak: sit rozpierzchły *Juncus effusus*, wierzbownica błotna *Epilobium palustre*, śmiałek darniowy *Deschampsia caespitosa*, jaskier rozłogowy *Ranunculus regens* oraz turzyca pospolita *Carex nigra*.

Następnym wyróżnionym zbiorowiskiem jest zespół sitowia leśnego *Scirpetum sylvatici*. Rośnie tu obok sitowia leśnego *Scirpus sylvaticus*, skrzyp błotny *Equisetum palustre* szczaw zwyczajny, pięciornik gęsi, niezapominajka błotna i groszek żółty *Lathyrus pratensis*.