

pokrzywa żegawka *Urtica urens*, przetacznik ożankowy *Veronica chamaedrys*, przetacznik polny *Veronica arvensis*, jasnota purpurowa *Lamium purpureum*, jasnota biała *Lamium album*, jasnota różowa *Lamium amplexicaule*, czyściec błotny *Stachys palustris*, mięta polna *Mentha arvensis*, oset kędzierzawy *Carduus crispus*, ostrożeń lancetowaty *Cirsium lanceolatum*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, ostrożeń błotny *Cirsium palustre*, mlecz polny *Sonchus arvensis*, mniszek lekarski *Taraxacum officinale*, starzec zwyczajny *Senecio vulgaris*, bluszczyk kurdybanek *Glechoma hederacea*, szeleźnik większy *Alectorolophus glaber*, lnica pospolita *Linaria vulgaris*, żywokost lekarski *Symphytum officinale*, kurzyślą polny *Anagallis arvensis*, powój polny *Convolvulus arvensis*, szczwół plamisty *Conium maculatum*, podagrycznik *Aegopodium podagraria*, blekot pospolity *Aethusa cynapium*, bodziszek drobny *Geranium pusillum*, śláz zaniedbany *Malva neglecta*, śláz dziki *Malva silvestris*, rzepik pospolity *Agrimonia eupatoria*, kuklik pospolity *Geum urbanum*, pięciornik gęsi *Potentilla anserina*, pięciornik rozłogowy *Potentilla reptans*, jeżyna popielica *Rubus caesius*, fiołek trójbarwny *Viola tricolor*, fiołek polny *Viola arvensis*, tasznik pospolity *Capsella bursa-pastoris*, jaskier bulwkowy *Ranunculus bulbosus* i wiele innych, zwłaszcza traw, jak np. wiechlina roczna *Poa annua*, perz właściwy *Agropyron regens* i życica roczna *Lolium temulentum*.

Wyżej wymienione rośliny zajmują przydroża, okrajki oraz rejony w pobliżu zabudowań, gdzie także występują płaty synantropijnych zbiorowisk roślinnych *Epilobio-Salicetum capreae* z dzikim bzem czarnym *Sambucus nigra* i wierzbą iwą *Salix caprea* oraz wprowadzoną kaliną hordowiną, *Rubo-Salicetum capreae*, zbiorowisko jeżyn i wierzby iwy oraz zbiorowisko wysokich bylin *Tanaceto-Artemisietum vulgaris* z wrotyczem i bylicą pospolitą.

W rejonie inwentaryzowanego obszaru zachowały się nieduże fragmenty łąk i pastwisk, które są koszone raz do roku lub wypasane są przez konie.

Mozna wyróżnić tu zespół kośnej i wilgotnej łąki eutroficznej *Cirsio polygonetum* z rdestem węzownikiem *Polygonum bistorta* i ostrożniem warzywnym *Cirsium oleraceum*. Zanotowano tu następujące gatunki roślin naczyniowych: kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*, wyczyniec łąkowy *Alopecurus pratensis*, kostrzewa łąkowa i czerwona *Festuca pratensis*, *F. rubra*, kłosówka wełnista *Holcus lanatus*, tymotka łąkowa *Phleum pratense*, wiechlina łąkowa *Poa pratensis*, barszcz zwyczajny *Heracleum sphondylium*, jaskier ostry *Ranunculus acris*, jaskier rozłogowy *Ranunculus repens*, szczaw zwyczajny *Rumex acetosa*, koniczyna łąkowa i biała *Trifolium pratense*, *T. alba*, babka lancetowata *Plantago lanceolata*, wyka ptasia *Vicia*