

cracca, krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, świetlik łąkowy *Euphrasia rostkoviana*, mniszek lekarski *Taraxacum officinale*, gwiazdnica pospolita *Stellaria media*, przytulia właściwa *Galium verum*, powój *Convolvulus arvensis*, oset nastroszony *Carduus acanthoides*, ostrożeń warzywny *Cirsium oleraceum*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, rzeżucha łąkowa *Cardamine pratensis*, firletka poszarpana *Lychnis flos-cuculi*, dzwonek rozpięchły *Campanula patula*, knieć błotna *Caltha palustris*, kuklik zwisty *Geum riale*, niezapominajka błotna *Myosotis scorpioides*.

Z ciekawszych gatunków zanotowano bodziszek łąkowy *Geranium pratense*.

Zanotowano tu zespół situ rozpięchłego *Epilobio-Juncetum effusi* z takimi roślinami jak: sit rozpięchły *Juncus effusus*, wierzbownica błotna *Epilobium palustre*, śmiałek darniowy *Deschampsia caespitosa*, jaskier rozłogowy *Ranunculus regens* oraz turzycza pospolita *Carex nigra*.

Następnym wyróżnionym zbiorowiskiem jest zespół sitowia leśnego *Scirpetum sylvatici*. Rośnie tu obok sitowia leśnego *Scirpus sylvaticus*, skrzyp błotny *Equisetum palustre* szczaw zwyczajny, pięciornik gęsi, niezapominajka błotna i groszek żółty *Lathyrus pratensis*.

Niewielkie powierzchnie okrajkowe wilgotnych łąk zajmują ziołorośla wiązówki błotnej *Filipendulo-Geranium*. Dominuje tu wiązówka błotna *Filipendula ulmaria* a domieszkę tworzą: sadziec konopiasty *Eupatorium cannabinum*, bodiszek błotny *Geranium palustre*, wierzbownica kosmata *Epilobium hirsutum*, tojeść pospolita *Lysimachia vulgaris*, trybula leśna *Anthriscus sylvestris*, żywokost lekarski *Symphytum officinale*, przytulia czepna *Galium aparine*, dzięgiel leśny *Angelica sylvestris* oraz pokrzywa zwyczajna i rdest wężownik *Polygonum bistorta*.

Niektóre partie łąk należą do żyznych łąk rajgrasowych *Arrhenatheretum medioeuropaeum*. W skład tych łąk wchodzi takie gatunki jak rajgras wyniosły *Arrhenatherum elatius*, bodiszek łąkowy *Geranium pratense*, i kozibród łąkowy *Tragopogon pratensis*. Obok nich rosną pospolite trawy jak kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita oraz inne rośliny jak lucerna siewna *Medicago sativa*, koniczyna biała, koniczyna łąkowa, złocień właściwy *Leucanthemum vulgare*, świerzbnica polna *Knautia arvensis*, chaber łąkowy *Centaurea jacea*, pępawa dwuletnia *Crepis biennis*.

Intensywniej użytkowane pastwiska to zespół życicy trwałej i grzebienicy pospolitej *Lolio-Cynosuretum*. Charakterystycznymi gatunkami tego zbiorowiska są: grzebienica pospolita *Cynosurus cristatus*, życica trwała *Lolium perenne*, koniczyna biała, brodawnik jesienny *Leontodon autumnalis* i stokrotka *Bellis perennis*.