

Ponadto w sąsiednich partiach lasu i ich obrzeżach zanotowano sójkę *Garrulus glandarius*, kruka *Corvus corax*, wronę siwą *Corvus corone* ziebę *Fringilla coelebs*, zaganiacza *Hippolais icterina*, pierwiosnka *P. collybita*, pokrzewkę ogrodową *Sylvia borin*, pleszkę *Phoenicurus phoenicurus*, rudzika *Erithacus rubecula*, pospolite sikory – bogatkę *Parus major*, modrą *P. coeruleus*, ubogą *P. palustris*, kowalika *Sitta europaea*, pełzacza ogrodowego *Certhia brachydactyla*, dzięcioła dużego *Dendrocopos major*, kosa *Turdus merula* i paszkota *Turdus viscivorus*. Wśród istniejących zabudowań gnieźdzą się: jerzyk *Apus apus*, jaskółka oknówka *Delichon urbica*, kopciuszek *Phoenocurus ochruros*, wróbel domowy *Passer domesticus*, mazurek *Passer montanus*, sroka *Pica pica* i kawka *Corvus monedula*. W strefie brzeżnej jeziora Roś i Pisy zanotowano: czapłę siwą *Ardea cinerea*, perkoza dwuczubego *Podiceps cristatus*, rybitwę zwyczajną *Sterna hirundo*, trzciniaaka *Acrocephalus arundinaceus*, trzcinniczka *Acrocephalus scirpaceus*, łożówkę *Acrocephalus palustris* i brzęczkę *Locustella luscinioides*.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia zanotowano obecność ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej UE z 1992 r. Są to bóbr *Castor fiber*, którego można stwierdzić po zgryzach na przywodnych wierzbach oraz wydry *Lutra lutra*. Do większych ssaków, które tu zanotowano należą: lis *Vulpes vulpes*, jenot *Nyctereutes procyonoides*, norka amerykańska *Mustela vison* oraz zachodzące tu od strony północno-zachodniej zając *Lepus europaeus*, a nawet dzik *Sus scrofa* i sarna *Capreolus capreolus*. Wśród zabudowań trafia się kuna domowa *Martes foina* i tchórz *Mustela putorius*. Sporadycznie widuje się tu wiewiórkę *Sciurus vulgaris* i karczownika ziemnowodnego *Arvicola terrestris*. Za to liczniejsze są tu szczur wędrowny *Rattus norvegicus*, mysz zaroślowa *Apodemus sylvaticus* i normica ruda *Clethrionomys glareolus*, kret *Talpa europaea* i jeż wschodni *Erinaceus concolor*. Z nietoperzy występują tu mroczek późny *Eptesicus serotinus*, karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*, nocek rudy *Myotis daubentoni* oraz borowiec wielki *Nyctalus noctula*. Z gadów najpospolitsza jest tu jaszczurka żyworodna *Lacerta vivipara*, a z płazów żaba moczarowa *Rana temporaria*, żaba trawna *Rana arvalis* i żaba wodna *Rana esculenta* oraz ropucha szara *Bufo bufo*.

2.8 Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie

Aktualne zagospodarowanie i użytkowanie obszaru opracowania na podstawie inwentaryzacji terenowej przedstawia Mapa 3.